



Spoedbehandeling (door dierenarts) van konijn dat niet eet:

- Subcutane injectie Metacam/Novacam/Meloxidyl (pijnstilling), startdosering 2 mg/kg 1dd.
Bij injectievloeistof 5 mg/ml komt dit overeen met 0,4 ml/kg lichaamsgewicht
Bij injectievloeistof 20 mg/ml komt dit overeen met 0,1 ml/kg lichaamsgewicht. (Tip: gebruik de 20 mg/ml oplossing om het volume van de te injecteren vloeistof te beperken.)
(N.B. startdosering is 2 mg/kg; onderhoudsdosering 1 mg/kg 2dd.)
- Subcutane injectie Prevomax (10 mg/ml Maropitant); dosering 3 mg/kg 1dd, dit komt overeen met 0,3 ml/kg lichaamsgewicht (stimulering maag-darmkanaal).
- Subcutaan warm infuus NaCl 0,9% of Ringer Lactaat; 50 ml/kg lichaamsgewicht 1dd. Liefst subcutaan want dan kan het dier mee naar huis!
- NIET DWANGVOEREN bij maagdilatatie door gas/vloeistof/voedsel en verdenking van obstructie van de maaguitgang.
- Check de lichaamstemperatuur; onderkoeling komt vaak voor! Normaalwaarde is 38 – 39,5°C. Bij een temperatuur < 35°C is de prognose infaust en euthanasie geïndiceerd.

Drs. A.G.E. de Jong, dierenarts
Dierenkliniek Animalis
Hoefslagendreef 9
2614 ML Delft
015-737 0135
dkanimalis@gmail.com
www.dierenkliniekanimalis.nl